

ARCEA

Scolopax rusticola



PIEZA DE CAZA

La arcea es una de las piezas de caza menor más codiciadas por los cazadores de la Cuenca del Esva y de toda Asturias, algunos muy especializados en esta pieza. Para detectarlas se debe contar con la colaboración de un buen perro de muestra. El tiro es difícil, ya que levantan bruscamente el vuelo y éste es muy rápido y zigzagueante.

Clase	AVES
Orden	Charadriiformes
Familia	<i>Scolopacidae</i>
Género	<i>Scolopax</i>
Especie	<i>Scolopax rusticola</i>

La Becada o Chocha perdiz o Sorda, recibe en Asturias el nombre de Arcea. Es un ave de tamaño mediano, de aspecto rechoncho, con plumaje abigarrado de colores ocre, negros y blancos y con un largo pico. El cuello y las patas son relativamente cortas, y las alas más bien cortas y redondeadas. Las partes inferiores son algo más claras y con franjas transversales finas. Mide unos 35 cm y pesa 325 gramos.

Son animales silenciosos y de costumbres discretas, siendo muy difíciles de observar por su coloración mimética y porque son muy reacias a levantar el vuelo. Su voz se escucha preferentemente durante la época de celo, cuando los machos realizan exhibiciones nupciales, al amanecer y al oscurecer, consistentes en vuelos lentos y erráticos sobre la copas de los árboles en circuitos más o menos fijos mientras emiten unas vocalizaciones características, delimitando así su territorio.

En Asturias hay arceas sedentarias, cuyo hábitat son las zonas boscosas, pero es durante el invierno cuando sus poblaciones se incrementan considerablemente con invernantes procedentes del norte de Europa. Durante el invierno su hábitat preferido son las márgenes fluviales y los prados húmedos, generalmente cerca de zonas arboladas o en el interior del bosque.

Es de costumbres crepusculares y se alimenta principalmente de invertebrados, con preferencia por las lombrices, que detectan bajo la superficie del suelo o entre la hojarasca con su sensible pico.

Reproducción	Entran en celo a principios de primavera.
Nidificación	El nido consiste en una depresión en el suelo, forrada con hierba y hojas secas, generalmente en la base de un árbol o arbusto.
Puesta	4 (2 a 5) huevos de color cremoso, con puntos, rayas y manchas pardas o de otros colores.
Incubación	20 a 23 días, a cargo de la hembra.
Desarrollo	Pollos nidífugos, que abandonan el nido a las pocas horas de la eclosión. Basan su supervivencia en su plumaje críptico, que los hace casi invisibles al mimetizarse con el suelo. Permanecen con la hembra 2 ó 3 semanas. Alcanzan la madurez sexual al año o dos años de edad y pueden alcanzar una longevidad de más de 20 años.
Organización social	Son animales solitarios o que van en parejas o en bandos muy pequeños.