


# LIEBRE DE PIORNAL

## *Lepus castroviejo*

### Las liebres ibéricas

Hasta épocas recientes se consideraba que las liebres de la Península Ibérica pertenecían a una misma especie; sin embargo actualmente se diferencian la liebre ibérica (*Lepus granatensis*), la liebre europea (*Lepus europaeus*) y la liebre de piornal (*Lepus castroviejo*), ésta última descrita en 1976. Aunque las tres son muy parecidas y sus áreas de distribución se superponen en algunos lugares, los caracteres distintivos se mantienen en las zonas de contacto, lo que hace suponer que no hibridan entre ellas.



### La liebre de piornal en la Cuenca del Esva: especie cinegética en declive

En la cuenca del Esva habita principalmente la liebre de piornal, aunque convive aquí con la liebre ibérica. Como en el resto de Asturias, las liebres son escasas y parecen estar en regresión en los últimos decenios. Se la encuentra preferentemente en zonas despejadas donde alternan matorrales y pastos, tales como las llanadas de La Espina y otras zonas altas de los cordales que hacen de divisorias fluviales.

La caza de la liebre de piornal, endémica de la Cordillera Cantábrica, permaneció vedada en los últimos años con el fin de tratar de incrementar sus poblaciones.

Clase	MAMÍFEROS
Orden	LAGOMORFOS
Familia	LEPÓRIDOS
Género	<i>Lepus</i>
Especie	<i>Lepus castroviejo</i>

Los lagomorfos (conejos y liebres) tienen cuatro incisivos en la mandíbula superior, lo que les diferencia de los roedores, con sólo dos.

La silueta de los lagomorfos es inconfundible, y en ella destacan las largas patas posteriores y las orejas desproporcionadamente largas. Estas características están especialmente desarrolladas en las liebres, que viven en espacios abiertos y no construyen galerías, por lo que su defensa ante los depredadores se basa en el camuflaje y, cuando son descubiertas, en una rápida carrera en la que se combinan velocidad, ágiles quiebro y grandes saltos.

Las liebres son mayores y más esbeltas que los conejos, con mayor longitud proporcional de las patas posteriores y las orejas; la cola es corta. La coloración es pardo-amarillenta en la zona dorsal y blanquecina por el vientre; el extremo de las orejas es negro. Un carácter distintivo de la liebre de piornal es la franja clara que recorre la parte inferior de la cara. Las liebres alcanzan una longitud total de 50 cm a 65 cm y un peso comprendido entre 1,5 kg y 3,5 kg.

Una característica de las liebres es que paren crías muy desarrolladas, que nacen con los ojos abiertos y que enseguida son capaces de caminar, a diferencia de los conejos, que nacen muy atrasados y desvalidos.

Las liebres son de actividad preferentemente nocturna. Se alimentan principalmente de hierba y otras materias vegetales. También comen sus excrementos, ya que contienen microorganismos que les ayudan a digerir la celulosa. Si disponen de alimento fresco apenas necesitan beber.

Reproducción	El celo y la reproducción pueden tener lugar en un período muy amplio, entre enero y octubre. El celo tiene lugar durante la noche y suele ser colectivo.
Gestación	41 a 42 días. Se da el fenómeno de la superfetación (en el organismo de la hembra se almacenan los espermatozoides del macho, que pueden utilizarse en el momento de la ovulación).
Partos	3 ó 4 camadas al año. Los partos se producen en una zona protegida por una vegetación densa. Puede haber partos sucesivos cada 34 a 40 días.
Número de crías	1 a 4 por parto.
Desarrollo	Las crías nacen muy desarrolladas, cubiertas de pelo y con los ojos abiertos. La madre las deja solas enseguida, y las crías se alejan algo del nido dispersándose unos metros; al oscurecer se reagrupan para ser amamantadas. Permanecen con su madre durante un mes, y alcanzan la madurez sexual muy pronto: a los tres meses los machos más precoces y a los cuatro meses las hembras. Pueden vivir entre 5 y 6 años en libertad (y hasta 12 años).
Organización social	Son animales solitarios excepto en época de celo.