

RATONERO COMÚN

Buteo buteo



El ratonero es la rapaz más abundante y más fácil de observar en la cuenca del Esva, ocupando hábitats diversos, con preferencia por los linderos de bosques y prados con arbolado. Su silueta en vuelo mientras planea forma parte del paisaje habitual de esta cuenca, y también es frecuente observarlo posado en lo alto de postes, apoyos de tendidos eléctricos o árboles mientras otea en busca de roedores y otros micromamíferos, componentes fundamentales de su dieta alimenticia. Sus chillidos mientras vuela son también muy característicos.

Clase	AVES
Orden	ACCIPITRIFORMES
Familia	ACCIPÍTRIDOS
Género	<i>Buteo</i>
Especie	<i>Buteo buteo</i>

El ratonero tiene el aspecto de una pequeña águila de formas compactas, con una silueta en vuelo caracterizada por las alas anchas y el borde de la cola redondeada.

El tamaño medio es del orden de 54 cm, y su envergadura (distancia entre las puntas de las alas abiertas) es de algo más de un metro (117 a 140 cm).

Como en otras rapaces, los machos son más pequeños que las hembras: mientras que éstas pueden superar el kilogramo de peso (700 - 1.200 gramos), los machos más pequeños apenas pesan medio kilo (550 - 850 gramos).

La coloración es muy variable: hay ejemplares muy pálidos y otros casi negros, predominando los tonos pardos, frecuentemente con una franja más clara en el pecho. También presentan una zona pálida en la parte inferior de las alas.

Uno de los nombres comunes en asturiano, “pardón”, alude a la coloración predominantemente parda de estas aves, y el nombre francés, “la busse variable” hace referencia a la variabilidad cromática de la especie.

La dieta del ratonero es muy variable, con preferencia por los pequeños mamíferos (hasta el tamaño de una cría de conejo), pero incluye también reptiles, aves, invertebrados y carroña.

Aunque los ratoneros del norte de Europa son migradores que pasan el invierno en zonas cálidas del sur de Europa, Asia y África, en la Península Ibérica son sedentarios (permanecen aquí todo el año), incrementándose sus poblaciones con los invernantes.

<i>Reproducción</i>	<i>El celo y la reproducción tiene lugar a finales de invierno o principios de primavera. Las puestas más tempranas tienen lugar en el mes de marzo.</i>
<i>Nidificación</i>	<i>Construyen el nido con ramas, generalmente en un árbol, más raramente en la repisa de un cortado rocoso.</i>
<i>Puesta</i>	<i>2 a 4 huevos blancos con motas pardo-rojizas.</i>
<i>Incubación</i>	<i>33 - 36 días, preferentemente por la hembra y con la colaboración del macho.</i>
<i>Desarrollo</i>	<i>Los pollos, como es común en todas las rapaces, son nidícolas. Nacen ciegos y desvalidos, y permanecen en el nido aproximadamente mes y medio, cuando completan su desarrollo. Permanecen con los padres otro mes y medio antes de hacerse totalmente independientes. Alcanzan la madurez sexual en su segundo o tercer año y pueden llegar a vivir unos 25 años.</i>
<i>Organización social</i>	<i>Son animales solitarios salvo en la época de reproducción y crianza de los pollos. Ambos progenitores colaboran en la incubación y también alimentan a sus crías hasta que se independizan totalmente.</i>